

- Petters A.-J. *Benthimermis gracilis* n. sp., nouveau mâle de la famille des Benthimermithidae. (Nematoda) // Ibid.—1982a.—Sect. A, 4, N 1/2.—P. 71—74.
- Petters A.-J. Description de deux nouveaux mâles de la famille des Benthimermithidae (Nematoda) de l'Atlantique sud-oriental // Ibid.—1982b.—Sect. A, 4, N 3/4.—P. 397—403.
- Petters A.-J. Quelques nouvelles espèces du genre *Benthimermis* Petters, 1980 (Benthimermithidae: Nematoda) du Sud de l'Océan Indien // System. Parasitol.—1983a.—5.—P. 1—15.
- Petters A.-J. Description d'un nouveau genre de Benthimermithidae (Nematoda) présentant des utérus munis de glandes annexes // Ann. Parasitol. Hum. Comp.—1983b.—58, N 2.—P. 177—184.

Московский университет им. М. В. Ломоносова

Получено 09.12.86

УДК 576.895.132 : 599.723

Г. М. Двойнос, В. А. Харченко

НОВЫЕ В ФАУНЕ СССР ВИДЫ ГЕЛЬМИНТОВ (NEMATODA, STROGYLOIDEA) ОТ ЛОШАДИ

В статье приводится переописание и уточнение систематического положения двух видов стронгилид — эндемиков Азии, обнаруженных у лошадей из Уральской обл. Казахской ССР.

Hsiungia K'ung et Yang, 1964 stat n.

Типовой вид: *Cylicocycclus* (*Hsiungia*) *pekingensis* K'ung et Yang, 1964.

Диагноз: Cyathostominae. Средних размеров (длина 15—20 мм). Ротовой воротник средней величины. Латеральные головные сосочки не выступают над поверхностью ротового воротника, субмедианные короткие, хорошо выражены. Наружная радиальная корона (НРК) состоит из многочисленных узких и длинных лепестков. Внутренняя радиальная корона (ВРК) из такого же количества сходных лепестков. Ее основание у верхнего края ротовой капсулы. Экстра-хитиновое основание НРК отсутствует. Ротовая капсула короткая, цилиндрическая, ее ширина в несколько раз превышает глубину. Стенки ротовой капсулы тонкие, с обрубчатым утолщением у нижнего края. Вентральная стенка примерно равна по длине дорсальной. Дорсальный желоб рудиментарен. Зубов в пищеводной воронке нет. Самицы. Края копулятивной бursy несколько зазубрены, но без бархочкостости. Дорсальное ребро расщеплено до места отхождения его проксимальной ветви. Спикулы нитевидные. Самка. Хвостовой конец прямой. Вульва значительно удалена от ануса. Вагина необычно короткая. Яйцеклетка Y-образной.

Hsiungia pekingensis (K'ung et Yang, 1964) comb. n. (рис. 1).

Материал. 19♀ и 24♂ от 3 лошадей из Уральской обл. Казахской ССР, вскрытых в Московском институте вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова. Экземпляры этого вида, определенные как *Cylicocycclus adersi* (Boulenger, 1920) Chaves, 1930 были обнаружены в монгольских сборах У. Чойжо, хранящихся во Всесоюзном институте гельминтологии им. К. И. Скрябина (ВИГИС) — 2♀, 3♂ и Гельминтологической лаборатории АН СССР (ГЕЛАН) — ♀, ♂ от мула, вскрытого 17.03.1951. Методика обработки материала описана ранее (Двойнос, Харченко, 1986).

Ротовой воротник отделен от остального тела слабо выраженной бороздкой. Верхняя часть субмедианных головных сосочков отделена перетяжкой. НРК состоит из 80—85 (88 — K'ung, Yang, 1964), ВРК из такого же количества сходных лепестков. Ниже стенок ротовой капсулы хорошо заметна склеротизированная пластинка, охватывающая верхний край пищевода. Внутренняя выстилка ротовой капсулы отходит сразу




Рис. 1. *Hsiungia pekingensis* (начало рисунка):

1 — ротовая капсула дорсовентрально; 2 — ротовая капсула латерально; 3 — апикальный срез головного конца тела; 4 — передний конец тела; 5 — дистальный конец половой конуса дорсовентрально; 6 — дистальный конец спикюлы; 7 — длина тела; ВРК — число лепестков внутренней радиальной короны; НРК — число лепестков наружной радиальной короны; шрк — ширина ротовой капсулы; Орк — длина ротовой капсулы; П — длина пищевода; цс — расстояние от цервикальных сосочков до головного конца тела; эк — то же от экскреторного отверстия; нк — нервные кольца; Др — длина дорсального ребра до места отхождения экстернодорсального ребра; Сл — длина спикюлы; Р — длина руляка; В — длина вагины; уА — расстояние от вульвы до ануса; А — расстояние от ануса до хвостового конца тела; Я1 — длина яиц; Я2 — ширина яиц.

позади основания ВРК и опускается вниз на небольшом расстоянии от стенок ротовой капсулы. Посередине ее глубины или несколько ниже, она сильно вдаётся внутрь к центру ротовой капсулы, образуя ряд пузыревидных выпячиваний. Дорсальный желоб сосцеобразный. Пищеводная воронка хорошо развита, с парой полукруглых сублатеральных выростов. Пищевод толстый, относительно короткий. Цервикальные сосочки и экскреторное отверстие примерно на одном уровне, несколько позади нервного кольца.

С а м е ц. Медианная доля копулятивной бursы необычно короткая. Латеральные доли отделены глубокими вырезками. Дополнительные веточки на дорсальном и остальных ребрах отсутствуют. Антеролатеральные и медиолатеральные ребра сомкнуты так же, как и вентральные, и равны им по длине. Половой конус конический, не выступает за пределы копулятивной бursы. Дермальный воротник хорошо развит как




Рис. 1. *Hsiungia pekingensis* (окончание рисунка):

5 — копулятивная бурса самца латерально; 6 — копулятивная бурса самца дорсовентрально; 7 — половой конус латерально; 10 — хвостовой конец тела самки. Обозначения те же.

на вентральной, так и на дорсальной сторонах полового конуса. Придатки полового конуса — пара овальных, несколько сплюснутых дорсовентрально образований, не соединяющихся друг с другом. Сморщиваясь, они образуют несколько тупых выпячиваний. Выпячивания дермального воротника отсутствуют. Рулек удлиненный с короткой рукояткой. Выступы, разделяющие его проксимальную и дистальную части мощные, вырезки широкие и глубокие. Дистальный конец спикул оригинальной формы, сходен с широким клинком.

Размеры (мм): длина тела 9—12,3 (15,8—17,0 K'ung, Yang, 1964), ширина ротовой капсулы 0,132—0,156, глубина ротовой капсулы 0,039—0,051, длина пищевода 0,701—0,958, расстояние от цервикальных сосочков до переднего конца тела 0,514—0,615, от экскреторного отверстия 0,486—0,586, от нервного кольца 0,400—0,457, длина дорсального ребра до места отхождения экстерно-дорсального ребра 0,228—0,414, длина рулька 0,237—0,270, длина спикул 1,176—1,288.

С а м к а. Хвостовой конец тела прямой, субвентральные выпячивания не развиты.




Рис. 2. *Cylicodontophorus mongolicus*:

1 — ротовая капсула дорсовентрально; 2 — ротовая капсула латерально.

Размеры: длина тела 12,1—16,6 (18,5—20,02 К'унг, Yang, 1964), ширина ротовой капсулы 0,177—0,207, глубина ротовой капсулы 0,045—0,057, длина пищевода 0,801—0,958, расстояние от цервикальных сосочков до переднего конца тела 0,601—0,744, от нервного кольца 0,429—0,543, расстояние от вульвы до хвостового конца тела 0,987—1,516, от ануса 0,415—0,572, размеры яиц 0,114—0,150×0,054—0,072.

Обсуждение. *Cylicocyclus* (*Hsiungia*) *pekingensis* K'ung et Yang, 1964 описан от ослов из Пекина и до настоящего времени был известен только по типам. Родовая принадлежность вида обосновывалась наличием кольцевого утолщения у нижнего края ротовой капсулы. Сближая его с *Cylicocyclus ultrajectinus* (Ihle, 1920) Ershov, 1939. К'юнг и Янг установили для этих видов отдельный подрод. Считая, что между этими видами различия достигают родового ранга, Р. Лихтенфелз полагал, что *C. pekingensis* гораздо ближе к роду *Poteriostomum* Quiel, 1919, хотя и отличается от него строением копулятивной бursy самцов и признал этот вид "species inquirenda" (Lichtenfels, 1975). Сравнительное морфологическое изучение обнаруженного вида обосновывает его родовую самостоятельность.

Представители рода *Poteriostomum* Quiel, 1919, обладают постепенно утолщающимися к нижнему краю стенками ротовой капсулы и расщепленным только до дистальной ветви дорсальным ребром. Этим род четко отличается от *Cylicodontophorus* Ihle, 1922. Обладая специфичной комбинацией признаков *Hsiungia pekingensis*, отличается как от рода *Cylicocyclus*, так и от этих двух родов и включение ее в состав любого из них выглядит искусственным.

Cylicodontophorus mongolicus Tshoijo et Popova, 1958 (рис. 2).

Материал. 25 ♀ и 11 ♂ от 2 лошадей из Уральской обл. Казахской ССР, вскрытых в Московском институте вакцин и сывороток. При сравнении его с паратипами (3 ♀ и 2 ♂), хранящимися в коллекции ГЕЛАН, установлена их идентичность.

Дифференциальный диагноз. Будучи мельче *C. mettami* Leiper, 1911, и подобно *C. euproctus* Boulenger, 1917, хорошо отличаясь от него размерами ротовой капсулы, полным отсутствием дорсального желоба, и щелеобразными протоками дорсальной пищеводной железы, расположенными у основания ротовой капсулы, он отличается от последнего основанием ВРК, расположенным позади верхнего края ротовой капсулы, на вентральной стороне, глубоко внутри ее. Характерна и форма стенок ротовой капсулы, относительно более коротких, чем у *C. euproctus* — толстые внизу, они сужаются выше основания ВРК. Протоки дорсальной пищеводной железы образуют выемки на нижнем

Морфологические измерения видов рода *Cylicodontophorus mongolicus*

Признак	<i>C. schuermanni</i> Ort lepp, 1962		<i>C. mongolicus</i>			
			Чойжо, 1959		наши данные	
	♂	♀	♂	♀	♂	♀
Т		9	7—8	9—11	7,0—8,1	8,3—11,6
ВРК		25				
НРК		50				
шрк	—	—	многочисленные		многочисленные	
дрк	—	—	0,091—0,125	0,095—0,145	0,087—0,126	0,099—0,150
П	0,470	0,600—0,630	0,025—0,029	0,021—0,033	0,033—0,044	0,039—0,050
ис		0,300	0,382—0,415	0,407—0,457	0,370—0,420	0,437—0,504
эо		0,330	0,394	—	0,403—0,448	0,420—0,448
нк		0,270	0,294—0,332	0,374—0,498	0,381—0,454	0,414—0,492
Др	1,2*	—	0,199—0,228	0,224—0,257	0,202—0,252	0,224—0,291
Сп	1,8	—	—	—	0,336—0,392	—
Р	—	—	—	—	1,57—1,85	—
В	—	0,3	0,174—0,214	—	0,185—0,213	—
V—A	—	0,15—0,18	—	0,224—0,282	—	0,246—0,314
A	—	0,24—0,33	—	—	—	—
Я1	—	0,102	—	0,158—0,174	—	0,162—0,241
Я2	—	0,050	—	—	—	0,105—0,111
						0,050—0,054

Примечание: обозначения признаков даны под рис. 1.

крае ротовой капсулы. Имея подобно указанным видам медианную долю копулятивной бursy самца средней величины, он также отличается от паразитирующего у зебр *C. schuermanni* (Ortlepp, 1962) Round, 1968, расположением основания ВРК, находящимся у последнего у верхнего края ротовой капсулы, а также как и от *C. mettami* отсутствием дорсального желоба. В таблице приведены сравнительные данные морфометрических измерений.

Обсуждение. До настоящего времени *Cylicodontophorus mongolicus* регистрировался единственный раз у лошадей и мулов МНР (Чойжо, 1957; Попова, 1958; Чойжо, 1959). Лихтенфелз (Lichtenfels, 1975) обозначал этот вид как "species inquirenda". Вместе с *Bidentostomum ivaschkini* Tshoi jo, 1957, *Tridentoinfundibulum gobi* Tshoi jo, 1957, *Hsiungia pekingensis* K'ung et Yang, 1964 он является специфичным паразитом лошадей Азии.

Двойнос Г. М., Харченко В. А. Новый вид нематоды (*Nematoda*, *Strongyloidea*) — паразита лошади // Вестн. зоологии. — 1986. — № 4. — С. 13—18.

Попова Т. И. Стронгилоидеи животных и человека. Трихонематиды // Основы нематодологии / Под ред. К. И. Скрябина. — М.: Изд-во АН СССР. — 1958. — Т. 7. — 424 с.

Чойжо У. Паразитические черви лошадей МНР: Дис... канд. вет. наук. — М., 1957. — 230 с.

Чойжо У. Новые гельминты лошади // Тр. Гельминтол. лаб. АН СССР. — 1959. — 9. — С. 346—361.

K'ung F. Y., Yang N. H. Strongylid parasites of donkeys in Peking. III. *Cylicocyclus pekingensis* sp. n. // Acta zool. sinica. — 1964. — 16, N 8. — P. 393—397 (Chinese text, English summary).

Lichtenfels J. R. Helminths of domestic equids. Illustrated keys to genera and species with emphasis on North American forms // Proc. Helminthol. Soc. Wash. — 1975. — Spec. issue, N 12. — P. 1—92.

Ortlepp R. J. *Trichonema* (*Cylicodontophorus*) *schuermanni* sp. n. from a zebra (*Equus burchelli* Gray, 1924) // Ondestepoort J. vet. Res. — 1962. — 29, N 2. — P. 169—172.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
АН УССР (Киев)

Получено 05.09.86